



**Наименование:** Ратибром 2 Паста

**Вид на биоцидния препарат:** Паста в предварителна опаковка (саше) от 10 г, съдържаща активното вещество бромадиолон, антикоагулант, ефективен срещу мишки и плъхове след еднократно поглъщане. Съдържа горчив агент с цел да се предотврати инцидентното поглъщане от деца.

**Област на приложение:** За контрол на плъхове и мишки във и около жилищни и селскостопански сгради, индустриални зони, складове, трюмове на кораби, железопътни вагони и складове, сгради с обществено предназначение, мазета, гаражи, килери, паркове и градини, животновъдни ферми, сметища и други открити площи.

**Категория на потребителите:** професионална.

**Разрешение на МЗ за пускане на пазара №:** 1670-2/17.10.2014г.

**Активно вещество:** Бромадиолон (CAS N°: 28772-56-7) 0.005 г/ 100 г. **Съдържа още:** денатониум бензоат 0.001 г/ 100 г.

**Не се класифицира в категориите на опасност, съгласно действащото законодателство.**

**S-фрази (съвети за безопасност):**

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

S20/21 По време на робата да не се яде, пие и пуши.

S24 Да се избягва контакт с кожата.

S37 Да се носят подходящи ръкавици.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.

Продуктът може да бъде опасен, ако бъде погълнат от домашни любимци или други нецелеви животни. При поглъщане да се предизвика повръщане. Незабавно се свържете с ветеринарен лекар и покажете опаковката или етикета.

**Производител и лице, което пуска на пазара:** Коллант с.п.а., Виа Триесте 49/53, 35121 Падуа, Италия, тел.(+39)499983000

**Дистрибутор:** Пест Контрол Продукти ООД, ул. Проф. Беньо Цонев № 2, 1517 София, тел:02/9451495, [www.pcp-bg.com](http://www.pcp-bg.com)

**Главна група:** 3 Контрол на вредители

**Продуктов тип:** 14 Родентициди

**Инструкции и дози на употреба:** Постава се поставя в маркирани дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия. Дератизационните кутии да се поставят в засегнатите от гризачите зони и помещения, до дупките на гризачите, по

## Етикет: Ратибром 2 Паста

маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат, на места недостъпни за деца, домашни животни и други нецелелеви животни. Дератизационните кутии в сформираните отровни точки са в брой и разположение, в зависимост от площите на засегнатите зони и плътността на заселване. Винаги бъдете сигурни, че дератизационните кутии са закрепени правилно и че примамката не може да бъде изнесена от гризачи.

### Дози за приложение:

За домашни мишки – 4 пликчета (40 г) за 10 м<sup>2</sup>,

За плъхове – 6-10 пликчета (60-100 г) за 10 м<sup>2</sup>, в зависимост от плътността на заселване.

Отровните точки се проверяват и в случай на консумация, повредена или замърсена примамка се презареждат през 5-7 дни, до спиране на консумацията и липсата на активност на гризачите.

**Инструкции за безопасна употреба:** Примамките да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум риска от консумация от деца или нецелелеви животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Да не се прилага в зони, където се съхраняват храни или фуражи, кухненски съдове или къдато повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с родентицидната примамка или да бъдат замърсени с нея. Да се избягва пипане на продукта с голи ръце, да се използват подходящи ръкавици. Ръцете и изложената кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът не е предназначен за постоянно приложение. Третирането да не продължава повече от 6 седмици. След края на третирането, да се премахват отровните точки с дератизационните кутии. Остатъците от примамка да се събират и предават за обезвреждане на специализирани фирми, съгласно действащите нормативни разпоредби. Да се премахват мъртвите животни, ако е възможно всеки ден. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в Областните Дирекции по Безопасност на Храните (ОДБХ), в съответствие с чл.259, ал.1 от Закона за Ветеринарномедицинската Дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл.259, ал.3 от ЗВМД. Използвайте подходящи ръкавици, при работа с мъртви животни. Третираните зони трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ. Дератизационните кутии, защитени срещу отваряне, трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. Да не се използват повторно дератизационните кутии и да не се изхвърлят в околната среда, а да се обезвредят в съответствие с нормативните разпоредби. В случай на съмнение за поглъщане, консултирайте се с центъра за контрол на отравянията. Прочетете внимателно етикета и информационния лист за безопасност.

**Първа помощ:** При поглъщане да се потърси незабавно лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета. В случай на замърсяване измийте добре ръцете си със сапун и обилно количество вода. Център за първа помощ: МБАЛСМ "Н.И.Пирогов", телефон за спешни случаи (02) 9154 409, e-mail: [poison\\_centre@mail.orbitel.bg](mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg), <http://www.pirogov.bg>. Антидот - витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).

**Медицинска информация:** Активното вещество в продукта е антагонист конкурент на витамин К и намалява чернодробния синтез на витамин К-зависимите фактори. Симптоми: поглъщането на големи количества от продукта води до силно инхибиране на витамин К. Може да се появи кървене от кожата, лигавицата, органите и паренхимата. Лечение: да се предизвика повръщане, да се направи стомашна промивка или да се даде активен въглен. Протромбиновата активност трябва да се наблюдава непосредствено след поглъщане и през следващите няколко дни и ако активността е намалена, да се приложи витамин К. Съгласувайте лечението с центъра за контрол на отравянията. Противопоказания: антикоагуланти.

**Унищожаване на отпадъците:** Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци.

**Опаковка:** 5 кг

**Дата на производство:**

**Дата на която изтича срокът на годност:**

**Партида №:**