

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД ПО ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ

№ 3642-2/04.06.2026 г.

На основание чл. 14а, чл. 17г, ал. 1 и чл. 17з и във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, подадени заявления с вх. № 13-БП-247/01.06.2026 г. и ВС-DV102121-46 и Заповед № РД 01-287/08.08.2017 г. на министъра на здравеопазването

РАЗРЕШАВАМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида

ICON 100 CS/Айкън 100 КС

II. Име и адрес на лицето, което предоставя на пазара биоцида

Syngenta Crop Protection AG

Anschrift Rosentalstrasse 67

4058 Basel

Швейцария

III. Име и адрес на производителя на биоцида

Syngenta Crop Protection AG

Anschrift Rosentalstrasse 67

4058 Basel

Швейцария

Място на производство:

Syngenta Chemicals BV, Rue de Tyberchamps 37

B-7180 Seneffe

Белгия

IV. Държава - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път – Гърция, разрешение № ТП18-0475 от 14.06.2021 г.

V. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

Главна група 3 - Контрол на вредители.

Продуктов тип 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

VI. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)

Течност - CS Суспензия капсула.

VII. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида

№ по ред	Наименование	CAS № и ЕС №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици	Производител на активно вещество
1.	Ламбда-цихалотрин	CAS № 91465-08-6 ЕС № 415-130-7	10,7 % (w/w)	Syngenta Crop Protection AG Anschrift Rosentalstrasse 67 4058 Basel, Швейцария Място на производство Huddersfield Manufacturing Centre, Leeds Road, West Yorkshire HD2 1FF Huddersfield Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Syngenta Crop Protection AG site 2 Dalian Road, Yangzhou Chemical Industry Zone 211402 Yizheng Jiangsu, Китай Syngenta Crop Protection AG site 3 Fifth Tong Hai Road, Rudong Coastal Economic Development Zone, 226407 Nantong, Jiangsu, Китай

VIII. Област/области на приложение

Биоцид за контрол на домашни мухи (*Musca domestica*) и оборни мухи (*Stomoxys calcitrans*) на закрито в помещения за следните подкатегории животни: млекодайки крави, говеда, свине, птици.

IX. Начин на употреба

Употреба 1 – На закрито. Мухи. Професионална употреба.

Биоцид за контрол на домашни мухи *Musca domestica* и оборни мухи *Stomoxys calcitrans* на закрито в помещения за следните подкатегории животни: млекодайки крави, говеда, свине, птици.

Биоцидът е концентрат, от който се приготвят водни работни разтвори.

За употреба на закрито:

Прилага се чрез пръскане - спрей с ниско налягане;

Обработка на повърхности.

Разходна норма: 25 mg активно вещество/m² (27,78 mg t.g. a.s./m²).

Разреждане: 25 ml от продукта в 5 литра вода (разходна норма 50 ml/m²).

Разреждане: 1 саше (62,5 ml продукт) в 10 литра вода (разходна норма 40 ml/m²).

Брой и време на прилагане: Максимум 2 приложения годишно.

Контролира популацията на мухи до 2 месеца.

Честота на прилагане: 2 приложения годишно.

Специфични инструкции за употреба:

Няма.

Специфични мерки за намаляване на риска:

Да се отстранят всички храни, фуражи и напитки преди третирането.

Да се покрият всички повърхности и съоръжения, които е вероятно да влязат в контакт с фуражи и питейна вода.

За употреба само в зони, които са недостъпни за кърмачета, деца, домашни любимци и нецелеви животни.

Да не се използва в помещения за животни, където експозицията на пречиствателна станция за отпадни води или директните емисии в повърхностните води не могат да бъдат предотвратени.

Разрешава се само за прилагане в помещения за животни (посочените подкатегории).

Да се носи защитен гащеризон [тип 6, EN 13034], защитни ръкавици и средства за защита на дихателните пътища (RPE), осигуряващи защитен фактор 10.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Инструкции за смесване и разреждане:

Да не се излива продуктът в празен резервоар на пръскачката.

Резервоарът на пръскачката да се почисти (с вода и препарат) преди употреба.

Резервоарът на пръскачката се пълни с вода до около половината от желанния обем.

Бутилката (или сашето) с биоцид се разклаща добре преди употреба.

В зависимост от желаното разреждане и разходната норма се добавя необходимото количество продукт в резервоара на пръскачката.

Пръскачката се разклаща добре.

Добавя се останалата половина от водата и се разклаща отново. Работният разтвор е готов за нанасяне.

Пръскачката периодично да се разклаща по време на обработката.

Уверете се, че пръскачката е правилно калибрирана (скорост на изпръскване, дебит и налягане), за да осигури равномерно приложение при правилния обем.

Продуктът не би трябвало да оцветява или да причинява увреждане на повечето повърхности в помещенията, когато водата се прилага в правилната доза. Препоръчва се първо да се третира малка площ и да се остави да изсъхне, за да се определи дали може да се появи оцветяване.

Да не се използват разтвори на водна основа върху електропроводи, корпуси на двигатели, разпределителни кутии, превключватели или друго електрическо оборудване поради възможна опасност от токов удар.

Почистване на оборудването: След третиране да се почисти старателно цялото оборудване. Остатъците от работен разтвор и отпадъчни води от изплакването трябва да се събират и изхвърлят в съответствие с нормативната уредба.

Изпразнете оборудването (пръскачката). Изплакнете обилно и промийте маркучите и дюзите с чиста вода. Почистете цялото друго свързано оборудване. Вземете всички необходими предпазни мерки при почистване на оборудването. Не почиствайте оборудването в близост до кладенци, водоизточници или растителност.

Обработка:

Биоцидът се нанася с помощта на всяка конвенционална ръчна или гръбна пръскачка с ниско налягане, оборудвана с дюзи за получаване на груб спрей/игловидна струя/ветрилообразна струя за приложение върху повърхности.

Нанася се върху стени, тавани/греди, около прозорци, вентилационни отвори и оборудване, на предпочитаните за кацане от мухите места в помещенията.

Да се прилага на места, недостъпни за животни.

Да се осигури адекватна вентилация по време на прилагането.

Стратегии за управление на развитието на резистентност:

- Когато е възможно, се препоръчва прилагането на продукта да се комбинира с нехимични мерки.

- За да се избегне развитието на устойчивост на насекоми към продукта, третиранията трябва да се редуват с инсектицидни продукти с различни механизми на действие.

- Ако се потвърди резистентност, незабавно да се спре употребата на продукта и да се премине към инсектицид с алтернативен начин на действие. Чрез премахване на селекционния натиск, резистентните индивиди ще бъдат отстранени с течение на времето и чувствителността в популацията трябва да се върне.

- Да се прилага препоръчителната доза от етикета срещу най-чувствителните стадии от жизнения цикъл на вредителите, за да се осигури пълен контрол.

- Да се следват добрите практики за приложение на инсектициди, за да се постигне максимална ефективност на продукта. Неспазването на препоръчаните на етикета дози и брой приложения ще позволи на оцелелите насекоми да изградят отново популацията.

Да се установи базова линия и да се наблюдават нивата на ефективност върху популациите в ключови области, за да се открият всякакви значителни промени в чувствителността към активното вещество. Информацията от програмите за мониторинг на резистентността позволява ранно откриване на проблеми и дава информация за вземане на правилно решение.

Потребителите трябва да информират, ако третирането е неефективно и да докладват директно на притежателя на разрешението. Притежателят на разрешението трябва да докладва за всички наблюдавани случаи на резистентност на компетентните органи, участващи в управлението на резистентността.

Мерки за намаляване на риска:

Да се избягва контакт с кожата, очите или дрехите.

Да не се яде, пие и пуши при работа с продукта.

Ръцете да се измият обилно със сапун и вода след работа с продукта.

Да не се прилага на открито.

Да се използва само в празни помещения, без присъствие на животните.

Да се покрият всички повърхности и съоръжения, които е вероятно да бъдат в контакт с фуражи и питейна вода.

За употреба само в зони, които са недостъпни за кърмачета, деца, домашни любимци и нецелеви животни.

Котките да се държат далеч от третираните повърхности. Поради особената си чувствителност към пиретроиди, продуктът може да причини тежки нежелани реакции при котки.

Да се ограничи достъпа на външни лица, деца и домашни любимци до третираните повърхности/зони, докато не изсъхнат.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца и домашни любимци.

Биоцидът и разределения продукт да не попада в повърхностните води или канализационната система.

Да не се прилага в или около вътрешните канали или на места, които рутинно се измиват.

Да не се прилага върху пчелни кошери и да не се изхвърля отпадъчен продукт или изплаквания в близост до пчелните кошери.

Насекомите могат да станат устойчиви на инсектициди, когато са подложени на селективен натиск. Ето защо, потребителите трябва да обмислят ротация на химически продукти (с различен механизъм на действие), когато разработват своите програми за борба с вредителите.

Разклатете добре бутилката (или сашето) преди употреба.

Да се пази от замръзване.

Х. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

А. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класове и категории на опасност:

Остра токсичност (инхал.), категория 4, H332.

Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 1, H410.

Етикетиране:

Пиктограми:



GHS07

GHS09

Сигнални думи: Внимание

Предупреждения за опасност:

H332 Вреден при вдишване.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN208 Съдържа 1,2-бензизотиазол-3-он. Може да причини алергична реакция.

Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.

P261 Избягвайте вдишване на аерозоли.

P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P312 При неразположение сеобадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

XI. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

Бутилка (HDPE) с вместимост - 80 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml и 1 L.

Сашета (PET) вместимостта на едно саше е 62,5 ml. Поставени в картонена кутия съдържаща х 5 сашета .

Бутилка (HDPE/PA (Соех)Е) с вместимост - 25 ml поставена в картонена кутия.

XII. Категория на потребителите

Професионална и професионалисти, отговарящи на изискванията на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г.

XIII. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).

2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.

3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

XIV. Срок на годност: 3 години при стайна температура.

Да се съхранява под ключ на добре проветриво място, защитено от слънце и влага и отделено от храни, напитки и фуражи. Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Контейнерите да НЕ се подреждат на купчини, по-високи от 2 m, за да се избегне уплътняване на продукта.

Да се пази от замръзване.

XIV. Разрешението се издава за срок до 14 юни 2027 г.

(срок, съответстващ на срока на разрешението, издадено от държавата - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път).

Настоящото разрешение отменя Разрешение № 3642-1/22.10.2024 г.

Пуснатите на пазара въз основа на Разрешение 3642-1/22.10.2024 г. биоциди, могат да бъдат продавани до изчерпване на количествата, но не повече от 6 месеца.

 Recoverable Signature

X Илия Тасев

Signed by: Iliya Kostadinov Tasev

ИЛИЯ ТАСЕВ

За Главен държавен здравен инспектор

(Съгласно Заповед № РД-15-542/16.02.2026 г.)